


Torra slemhinnor

47 % av alla kvinnor i och efter klimakteriet drabbas av underlivsbesvär som beror på minskad östrogenproduktion.




Östrogenet underlättar blodcirkulationen, ser till att sekretproduktionen fungerar och skyddar mot infektioner. När östrogenproduktionen minskar kan slemhinnorna i underlivet och urinröret bli skörare, torrare och mindre elastiska. Du kan få besvär som klåda, sveda, smärta, urinläckage, upprepade urinvägsinfektioner och smärta vid samlag. Att cykla, sitta och gå kan också bli besvärligt, framför allt om du bär åtsittande kläder. Till skillnad från värmevallningar, som försvinner efter klimakteriet, brukar problemen med torrhet i underlivet bestå.

Genom att tillsätta lokalt östrogen kan du få hjälp med besvären. Tänk på att behandlingar mot vaginal torrhet utan östrogen inte ger någon bestående effekt om besvären är orsakade av östrogenbrist.



Frisk, tjock slemhinna med god östrogennivå.



Tunn, torr och skör slemhinna på grund av östrogenbrist.

Vagifem® (estradiol) – återställer torra underliv med naturligt östrogen

Vagifem® innehåller östrogen som är identiskt med det kroppen själv producerar. Genom vaginaltablettarna verkar östrogenet endast där det gör nytta – på vaginalslemhinnan.

Låt det bara säga klick

Tabletten appliceras med en applikator och genom ett litet klick fäster du tabletten på slemhinnan. Därefter frigörs östrogenet successivt, utan något kladd eller läckage.

Vagifem® gör att slemhinnorna får tillbaka sin elasticitet och tjocklek. Torrhets känslan, klådan och smärtan försvinner helt eller delvis. Underlivets pH-värde balanseras, vilket återställer den normala bakteriefloran. Du kan förvänta dig en effekt redan under den första månaden. Eftersom östrogenbristen är kronisk bör du fortsätta med behandlingen för att effekten inte ska försvinna. Finns receptfritt på alla apotek. Läs mer på www.vagifem.se



Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st. Vagifem används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationsperioden (menopaus). **Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.** Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. **Läs bipacksedeln noga.**

SE19VG00014 JUNI 2019